

## MYCOHYDRALIN crème

Mis à jour : Mardi, 22 Octobre 2013.

### Antifongique local

### Dans quel cas le médicament MYCOHYDRALIN crème est-il prescrit ?

Cette crème contient un [antifongique](#) de la famille des imidazolés.

elle est utilisée dans le traitement de certaines maladies de la peau, des ongles et des muqueuses, dues à des champignons microscopiques (mycoses) : [candidose](#), [pityriasis versicolor](#), dermatophyties...

### Présentations du médicament MYCOHYDRALIN crème

**MYCOHYDRALIN** : crème ; tube de 20 g

- Non remboursé - Prix libre



### Composition du médicament MYCOHYDRALIN crème

	p 100 g
Clotrimazole	1 g

**Substance active** : [Clotrimazole](#)

Excipients : [Alcool](#) benzylique, [Alcool](#) cétostéarylique, Eau purifiée, Octyldodécanol, Palmitate de cétyle, Polysorbate 60, Sorbitan stéarate

### Contre-indications du médicament MYCOHYDRALIN crème

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux antifongiques de la famille des imidazolés.

### Attention

Évitez d'utiliser ce médicament de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

### Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## **Mode d'emploi et posologie du médicament MYCOHYDRALIN crème**

La crème doit être appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

### **Posologie usuelle :**

1 application, 2 fois par jour.

La durée du traitement varie selon les infections. Suivre la prescription de votre médecin ou les conseils de votre pharmacien.

### **Conseils**

En cas de [candidose](#), évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament. Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.

### **Effets indésirables possibles du médicament MYCOHYDRALIN crème**

Sensation de brûlure, rougeur, démangeaisons.